

Infecciones de Oído en Niños



Tener dolor de oído o infección de oído, NO significa que se necesite tomar antibióticos. La razón por la cual posiblemente su doctor NO le prescriba antibióticos a su niño es que:

No todos los dolores de oído son causados por infección bacteriana. El dolor de oído puede ser causado por:

- ➔ Bacteria
- ➔ Virus
- ➔ Que el canal del oído esté tapado
- ➔ Presión o líquido en el oído medio
- ➔ Problemas con la quijada o la garganta

De éstos, SOLAMENTE los dolores causados por bacteria deberán ser tratados ALGUNAS VECES con antibióticos.

MÁS DE LA MITAD de las infecciones de oído, son causadas por VIRUS, y NO se aliviarán con antibióticos. Estos virus se irán por sí solos, con el tiempo.

Usted puede ayudar a su niño a SENTIRSE mejor, sin importar lo que ocasiona el dolor.

Usted PUEDE:

- ➔ Darle paracetamol (como Tylenol) o ibuprofeno (como Advil y Motrín) para el dolor de oído, dolor de cabeza, o fiebre, como lo indique su doctor. **NO le dé aspirinas a su niño.**
- ➔ Poner a dormir a su niño con la cabeza un poco levantada, para que el dolor sea menos. Si su niño es mayor de 2 años, póngale suficientes almohadas bajo su cabeza.
- ➔ Mantener a su niño alejado del humo de cigarro.

Si su doctor le prescribe antibióticos:

- ➔ Termine TODO el tratamiento con antibióticos, como se lo indique su doctor, aún si usted ya se siente mejor, sin haberse terminado la medicina.
- ➔ DEJE de tomarse el antibiótico y LLAME al doctor, si le aparece salpullido.
- ➔ NUNCA tome sobrantes de antibióticos (ya sean de usted mismo o de alguien más).

Hable con su doctor, acerca de tomar la medicina adecuada, para el microbio adecuado.

Y siempre llene a sus niños de abrazos.

Visita nuestro sitio en el internet al: www.aware.md

 **WARE**[®]
Alliance Working for
Antibiotic Resistance Education

A project of **CMA Foundation**